

## 乳幼児の予防接種 一覧表

予防接種の種類		標準的な接種年齢と回数	接種対象年齢
ロタウイルス	1価	出生6週0日後から出生 24 週0日後まで 27 日以上の間隔をおいて2回	出生6週0日後から 出生24週0日後まで
	5価	出生6週0日後から出生 32 週0日後まで 27 日以上の間隔をおいて3回	出生6週0日後から 出生32週0日後まで
B 型肝炎		生後2か月以上9か月未満までに、27 日以上あけて2回、1回目から 139 日以上あけて1回追加	1歳未満
ヒブ(Hib)	初回	初回接種の開始は生後2か月以上7か月未満で27 日から56日あけて3回(生後 1 歳未満までに終了させる)	生後2か月以上5歳未満 (注1)
	追加	初回の3回目終了後、7か月以上 13 か月未満の間に1回	
小児用肺炎球菌	初回	初回接種の開始は生後2か月以上7か月未満で27 日以上あけて3回(生後 1 歳未満までに終了させる)	生後2か月以上5歳未満 (注2)
	追加	初回の3回目終了後、60 日以上あけて1歳以上1歳3か月未満の間に1回	
BCG		生後5か月以上8か月未満に1回	1歳未満
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)	1期 初回	生後2か月から7か月未満の間に、20 日から56 日あけて3回	生後2か月以上7歳6か月未満
	1期 追加	1期初回の3回目終了後、6か月以上 18 か月未満の間に1回	
麻しん風しん (MR)	1期	1歳以上2歳未満の間に1回	1歳以上2歳未満
	2期	5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間の間に1回	5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間(年度内に6歳になる者)
水痘		1歳以上1歳3か月未満の間に1回、1回目の接種後6か月以上12か月未満あけて1回	1歳以上3歳未満
日本脳炎	1期 初回	3歳以上4歳未満の間に、6日から 28 日あけて2回	生後6か月以上7歳6か月未満
	1期 追加	4歳以上5歳未満の間に、1期初回の2回目終了後おおむね1年あけて1回	

※注1:ヒブは、接種開始が生後7か月以上1歳未満の場合は、27日以上あけて2回接種し、追加は2回目終了後、7か月以上あけて1回接種。接種開始が1歳以上5歳未満の場合は、1回接種となります。

※注2:小児用肺炎球菌は、接種開始が生後7か月以上1歳未満の場合は、27日以上あけて2回接種し、追加は2回目終了後60日以上あけて1回接種。接種開始が1歳以上2歳未満の場合は、60日以上あけて2回接種。接種開始が2歳以上5歳未満の場合は、1回接種となります。